


Guía para Familias

Cómo usar Exosomas Liofilizados



Importante

Lo que recibe:

1 vial de exosomas liofilizados (10 ml) →

+ 1 vial vacío y estéril de 30 ml →




Lo que debe comprar:



Toallitas con alcohol

Toallitas isopropílicas estériles al 70%, grado médico (empaquetadas individualmente); 5 toallitas por tratamiento (una por día);



Solución salina estéril

Cloruro de sodio al 0,9% para inhalación.
Puede utilizarse 30 ml de solución salina estéril al 0,9% o 30 ml de agua destilada estéril;



Jeringas y agujas

Jeringas de plástico de 15–20ml con agujas de calibre 18G, selladas y empaquetadas individualmente. Se necesitan 5 jeringas por tratamiento;



Guantes

1 par de guantes por aplicación.
5 pares en total por tratamiento;



Vitalia24
INNOVATIVE HEALTHCARE

Preparación




1) Asegúrese de tener una superficie de trabajo limpia y alejada de ventanas o puertas abiertas.




2) Prepare la jeringa (se recomienda de 15-20ml), las toallitas con alcohol, los guantes médicos, la solución estéril, los exosomas liofilizados derivados de células madre mesenquimales de 10 ml y el vial vacío y estéril de 30 ml.



3) Con la jeringa, tome 5 ml de la solución estéril e inyéctelos en el vial de 10 ml que contiene el polvo de exosomas liofilizados. Gire suavemente el vial boca abajo hasta que el polvo se disuelva. Agregue otros 5 ml de solución estéril.



4) Con la jeringa, extraiga los 10 ml de la solución de exosomas disuelta e inyéctelos en el vial estéril de 30 ml proporcionado.



5) Agregue 20 ml de solución estéril al vial de 30 ml.

La solución de exosomas ya está lista para su administración. Por favor, recuerde mantenerla almacenada en el refrigerador.

Importante



Vitalia24
INNOVATIVE HEALTHCARE

Aplicación



1) Saque el vial con la solución de exosomas del refrigerador y gírelo suavemente varias veces boca abajo para obtener una solución homogénea.

Por favor, recuerde: ¡NO AGITAR!



2) Abra una jeringa con aguja.



3) Limpie el tapón del vial con la toallita estéril.



4) Inserte la aguja en el vial y tire suavemente de la jeringa hasta llenarla con 5 ml de solución.

5) Extraiga lentamente la aguja del vial y vierta los 5 ml de solución de la jeringa en la cámara del nebulizador (si aún no tiene uno, puede pedirlo online).



6) Coloque la mascarilla del nebulizador en la cara del paciente y comience el tratamiento de inhalación.

7) Repita este procedimiento durante 5 días (5 ml de solución por día).

Información adicional


No hay un horario estricto para la inhalación, pero no administre la inhalación al menos 30 minutos después de una comida abundante.



No es necesario calentar el vial con la mano.



Trate de minimizar el tiempo que los exosomas permanecen fuera del refrigerador.



Para más preguntas, por favor póngase en contacto con Vitalia24.



Vitalia24
INNOVATIVE HEALTHCARE