

Что вы получаете:

1 флакон лиофилизированных экзосом (10 мл)






Что вам нужно купить:



Спиртовые салфетки

Стерильные салфетки медицинского назначения, пропитанные 70% изопропиловым спиртом (в индивидуальной упаковке). 5 салфеток на процедуру (по одной в день).



Стерильный физиологический раствор

0,9% хлорида натрия для ингаляций. Либо 30 мл стерильного физиологического раствора 0,9%, либо 30 мл стерильной дистиллированной воды.



Шприцы и иглы

Пластиковые шприцы объемом 15–20 мл с иглами 18G, индивидуально запечатанные и упакованные. На одну процедуру требуется 5 шприцев.



Перчатки

1 пара перчаток для каждого применения. Всего 5 пар на процедуру.






Подготовка




1. Убедитесь, что у вас есть чистая рабочая поверхность вдали от открытых окон или дверей.




2. Подготовьте шприц (рекомендуется 10 см3 - 20 см3), спиртовые салфетки, больничные перчатки, стерильную жидкость, 10 мл лиофилизированных экзосом, полученных из мезенхимальных стволовых клеток, и пустой стерильный флакон на 30 мл.



3. С помощью шприца возьмите 5 мл стерильного раствора и введите во флакон на 10 мл, содержащий лиофилизированный порошок экзосом. Осторожно переверните флакон вверх дном, пока порошок не растворится. Добавьте еще 5 мл стерильного раствора.



4. С помощью шприца извлеките 10 мл растворенного раствора экзосом и введите его в предоставленный стерильный флакон на 30 мл.



5. Добавьте 20 мл стерильного раствора во флакон на 30 мл.

Теперь раствор экзосом готов к введению. Пожалуйста, не забудьте хранить его в холодильнике.



Приложение



1. Достаньте из холодильника флакон с раствором экзосом и АККУРАТНО переверните его вверх дном несколько раз, чтобы получить однородный раствор. Помните: НЕ ТРЯСТИ!




2. Достаньте из упаковки один шприц с иглой.



3. Протрите защитную пленку флакона стерильной салфеткой.



- 4. Вставьте иглу во флакон и аккуратно потяните шприц, чтобы наполнить его 5 мл раствора.
- 5. Медленно вытяните иглу из флакона и наберите 5 мл раствора из шприца в камеру небулайзера (если у вас его еще нет, вы можете заказать его онлайн).





7. Повторяйте эту процедуру в течение 5 дней (по 5 мл раствора в день).

Дополнительная информация

Строгого графика ингаляций нет, но не делайте ингаляцию ранее чем через 30 минут ПОСЛЕ обильного приёма пищи.



Нет необходимости разогревать флакон вручную.



Постарайтесь максимально сократить время хранения экзосом вне холодильника.



По всем вопросам обращайтесь к Vitalia24.



