


מדריך משפחתי כיצד להשתמש באקסוזומים שעברו ליופיליזציה



מה אתה מקבל

בקבוקון אחד של אבקת אקסוזומים
שמקורם בתאי גזע מזנכימליים (10 מ"ל)




בקבוקון ריק וסטריילי בנפח 30 מ"ל

מה שאתה צריך לקנות



פדים לחיטוי באלכוהול – אלכוהול
איזופרופיל 70 % סטרילי בדרגת רפואה,
ארוז בנפרד; 5 פדים לטיפול (אחד בכל יום)




תמיסת מלח סטרילית (0.9 % נתרן
כלוריד) או מים מזוקקים סטריליים בסך 30



מזרקים ומחטים – מזרקי פלסטיק 15-20
ארוזים וסגורים בנפרד. 18 מ"ל עם מחט
נדרשים 5 מזרקים לטיפול של 5 ימים



כפפות חד-פעמיות סטריליות – זוג אחד
לכל יישום (סה"כ 5 זוגות)



שלב ההכנה




1. ודאו שמשטח העבודה נקי ומרוחק מחלונות פתוחים או דלתות




2. הכינו מזרק (מומלץ 10-20 מ"ל), פדים לחיטוי, כפפות, תמיסה סטרילית, בקבוקון האקסוזומים המיובשים (10 מ"ל) והבקבוקון הריק בבנפח 30 מ"ל



3. שאבו 5 מ"ל מהתמיסה הסטרילית והזריקו לבקבוקון שבו אבקת האקסוזומים. הפכו בעדינות את הבקבוקון עד שהאבקה נמסה (לא לנער!), והוסיפו עוד 5 מ"ל תמיסה



4. בעזרת המזרק שאבו את 10 המ"ל של תמיסת האקסוזומים והעבירו אותה לבקבוקון הריק 30 מ"ל



5. הוסיפו לבקבוקון 30 מ"ל עוד 20 מ"ל של תמיסה סטרילית. שמרו את התמיסה במקרר

שלבי השימוש



1. הוציאו את בקבוקון האקסוזומים מהמקרר והפכו אותו בעדינות מספר פעמים כדי לאחד את התמיסה (לא לנער!)



2. פתחו מזרק חדש עם מחט



3. נקו את פקק הבקבוקון בעזרת פד חיטוי סטרילי



4. החדירו את המחט לבקבוקון ושאבו 5 מ"ל מהתמיסה



5. הזריקו את 5 המ"ל לתא של מכשיר האינהלציה (נבולייזר). אם אין ברשותכם נבולייזר, ניתן להזמין באינטרנט



6. הניחו את מסכת הנבולייזר על פני המטופל והתחילו את הטיפול בשאיפה

7. חזרו על הפעולה פעם ביום במשך 5 ימים (5 מ"ל בכל יום)

מידע נוסף


אין צורך בלוח זמנים קבוע
לאינהלציה, אך מומלץ לא לבצע
את הטיפול לפחות 30 דקות
לאחר ארוחה כבדה



אין צורך לחמם את הבקבוקון ביד
לפני השימוש



מומלץ לצמצם את הזמן שבו
האקסוזומים נמצאים מחוץ
למקרר



לשאלות נוספות או סיוע ניתן
ל-Vitalia24-לפנות ל



Vitalia24
INNOVATIVE HEALTHCARE